

## NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE

Lek DoppelSil MAX, zawiera sildenafil w dawce 50 mg, wskazany jest do stosowania u dorosłych mężczyzn (powyżej 18 r.ż.) w leczeniu zaburzeń wzrodu (erekcji), czyli braku możliwości uzyskania lub utrzymania sztywności prącia wystarczającej do odbycia stosunku. Jeżeli nie spełniasz przynajmniej jednego z powyższych warunków, ten lek NIE jest dla Ciebie!

Przed zastosowaniem leku DoppelSil MAX należy skorzystać z dołączonego narzędzia diagnostycznego i odpowiedzieć na poniższe pytania.

I. Czy przyjmuje Pan leki stosowane do łagodzenia objawów choroby wieńcowej (dławicy piersiowej, bólu w klatce piersiowej):	TAK	NIE WIEM	NIE
• nitroglicerynę (np. Nitrocard, Nitroderm, Nitromint, Minitran, Sustonit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• monoazotan izosorbidu (np. Efoxx, Mono Mack, Mononit, Monosan, Olicard)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• pentaerytrytol (np. Galpent, Pentaerythritol compositum)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• molsidominę (np. Molsidomina WZF)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• nikorandyl (np. Angedil, Nicorandil Dexcel Pharma)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. Czy stosuje Pan sakubityryl z walsartanem (np. Entresto, Neparvis)	TAK	NIE WIEM	NIE
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

III. Czy stosuje Pan środki uwalniające tlenek azotu (np. azotyn amylu), tzw. poppers?	TAK	NIE WIEM	NIE
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IV. Czy stosuje Pan riociguat (np. Adempas) w leczeniu nadciśnienia płucnego?	TAK	NIE WIEM	NIE
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

V. Czy przyjmuje Pan rytonawir (np. Norvir) w leczeniu zakażenia HIV?	TAK	NIE WIEM	NIE
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


VI. Czy przyjmuje Pan leki alfa-adrenolityczne stosowane z powodu rozrostu gruczołu krokowego lub wysokiego ciśnienia krwi, zawierające:	TAK	NIE WIEM	NIE
• doksazosynę (np. Cardura, Apo-Doxan, Doxar, Zoxon)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• terazosynę (np. Hytrin)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• tamsulozynę (np. Omnic, Prostamnic, Ranlosin, Symlosin SR, Adatam, Apo-tamis, Bazetham, Uprox)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• alfuzosynę (np. Dalfaz, Alfuzostad, Alfabax, Alugen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• sylodosynę (np. Urorec)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VII. Czy występują u Pana następujące objawy?	TAK	NIE WIEM	NIE
• w przeszłości pojawił się ból za mostkiem w klatce piersiowej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• w ciągu ostatniego miesiąca zauważyłeś wyraźne pogorszenie samopoczucia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• zwykła, codzienna aktywność fizyczna (np. mycie się, ubieranie) powoduje duszność, kołatanie serca lub wyraźne zmęczenie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• często odczuwasz przyspieszone lub nierówne bicie serca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• częste zawroty głowy, wrażenie omdlewania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• masz zwykle niskie ciśnienie tętnicze krwi (poniżej 90/50 mmHg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• masz zwykle wysokie ciśnienie tętnicze krwi (powyżej 150/90 mmHg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VIII. Czy dotyczy Pana którakolwiek z poniższych sytuacji?	TAK	NIE WIEM	NIE
• w ostatnich 6 miesiącach przebyłeś zawał serca lub udar mózgu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• w ciągu ostatnich miesięcy doszło u Ciebie do utraty przytomności przy gwałtownej zmianie pozycji ciała	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• rozpoznano u Ciebie choroby prącia (skrzywienie prącia, które utrudnia penetrację lub chorobę Peyroniego - stwardnienie plastyczne prącia)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• stosujesz już inne metody leczenia zaburzeń erekcji niż leki zawierające syldenafil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• leczysz się z powodu zakażenia wirusem HIV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• utraciłeś wzrok w jednym oku w wyniku innej przyczyny niż uraz, zaćma lub jaskra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• kiedykolwiek wystąpił u Ciebie przedłużający się wzwód, trwający dłużej niż 4 godziny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• rozpoznano u Ciebie dziedziczne zaburzenia funkcji siatkówki oka (takie jak tzw. zwyrodnienie barwnikowe)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• rozpoznano u Ciebie rzadko występujące, dziedziczne nieprawidłowości dotyczące kształtu czerwonych ciałek krwi (tzw. niedokrwistość sierpowatokrwinkowa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• rozpoznano u Ciebie ciężkie zaburzenia czynności wątroby (w tym marskość wątroby)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• rozpoznano u Ciebie ciężkie zaburzenia czynności nerek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• uczulenie na syldenafil lub którykolwiek ze składników produktu DoppelSil MAX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IX. Czy obecnie choruje Pan na:	TAK	NIE WIEM	NIE
• chorobę wrzodową, której dolegliwości nasiliły się w ostatnim tygodniu (ból brzucha, nudności, wymioty)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• białaczkę (choroba nowotworowa krwi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## PAMIĘTAJ!

Jeśli nadal nie jesteś pewien, czy możesz zastosować lek DoppelSil MAX, 50 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, przed użyciem leku skonsultuj się z farmaceutą.

Problemy ze wzwodem mogą być wywołane innymi lekami, które przyjmujesz lub innymi chorobami na które cierpisz (np. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, hipercholesterolemia lub choroby układu krążenia). Właściwe leczenie niektórych schorzeń może spowodować ustąpienie zaburzeń wzwodu. Występowanie zaburzeń wzwodu jest również ważną wskazówką dla lekarza, która może pomóc mu w diagnostyce niektórych chorób, w tym chorób serca. Dlatego też w trakcie okresowych wizyt zawsze poinformuj swojego lekarza o problemach ze wzwodem i o tym, że przyjmujesz DoppelSil MAX.